


LIHTVÄETIS | MAGNEESIUMTOOTED

Magneesiumsulfaat

Aianduslik kvaliteet



Koostis (%w/w)

Magneesiumoksiid	16%
Vääveltrioksiid	32%

Ühilduvus

Sobib kasutamiseks koos teiste väetistega, välja arvatud kaltsiumväetised. Seetõttu on vaja eraldi mahutit või tuleb väetiseid kasutada erinevatel aegadel.

Pakend



- Sobib mahepõllumajandusse vastavalt määrusele (EÜ) 834/2007
- Parandab lehtede värvi
- Lehtedele pritsimisel loob ebasoodsad tingimused seente kasvuks
- Sobib kastmisväetiseks avamaal ja kasvuhoonetes. Sobib ka lehtede pritsimiseks.

Toote omadused

- Valged kristallid
- Madal raskemetallide sisaldus – naatrium ja kloriid
- Lihtne käsitseda, lahustada ja kasutada

Annustamine | Hüdroomika

kg 1000 l lahuses	MgO in kg	SO ₃ in kg
75	12,0	24,0
100	16,0	32,0
125	20,0	40,0

Mainitud kontsentratsioonid esindavad toitainete hulka lahuses. Lõplik kontsentratsioon kastmisvees sõltub toitainete kogusest lahuses, pritsimise suhtest ja vees kasutatud toitainete kogusest.

Kas teadsid?

Van Iperen pakub laia valikut magneesiumtooteid! Meie magneesiumivalik koosneb kõrgkvaliteedilistest lahustuvatest ja vedelatest toodetest. Koos meie kelaaditud magneesiumväetistega pakume lahendusi lehtedele pritsimiseks ja väetamiseks avamaal ja kõrgtehnoloogilistes mullata kultuurides. Van Ipereni magneesiumtooted kuuluvad Ipereni eriväetiste laiendatud valikusse.

Annustamine | Väetamine

Kultuur	Kasutamise aeg	Min kg/ha/hooajal	Max kg/ha/hooajal
Viljapuud 	• Õitsemise lõppedes	150	250
Köögiviljad 	• Vegetatiivse kasvu ajal	150	300
Viinamarja-istandused 	• Lehepuude pungade avanemisest alates • Kuni õitsemise alguseni	100	150

Kus toitumine kohtub Biostimulatsiooniga™

Van Iperen International on Hollandi eriväetiste tootja. Pakume laia valikut väetisi, mis ühendavad toitumise ja biostimulatsiooni. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Van Iperen müügiesindajaga.

www.vaniperen.com

Kasvatage parimat.

Annustamine | Lehtede pritsimine

Kultuur	Kasutamise aeg	Min kg/ha/kord	Max kg/ha/kord	Konsentratsioon % (w/v)
Viljapuud 	3 - 4 kasutuskorda • Alates viljade moodustumisest • 10 - 14 päevase intervalliga	3	5	0.5
Köögiviljad 	1 - 3 kasutuskorda: • Alates vegetatiivsest kasvust • 10 - 14 päevase intervalliga	5	10	1.0
Mais 	1 - 2 kasutuskorda: • 4-6 lehe staadiumis • 10 - 14 päevase intervalliga	3	6	1.0 - 1.5
Suhkrupeet 	2 - 3 kasutuskorda: • Suvine kasutamine	3	6	1.0 - 1.5
Viinamarja-istandused 	3 - 4 kasutuskorda: • Vegetatiivsest kasvust • 10 - 14 päevase intervalliga	4	12	1.0 - 1.5
Raps 	1 - 2 kasutuskorda: • Kuni õitsemise alguseni	3	6	1.0 - 1.5

Lehtede väetamise korral taimekaitsevahendite või muude väetistega segatuna, tuleb enne pritsisegu valmistamist teha ühilduvustest.

Eelpool nimetatud soovituslikud annused ja kasutamisaegad on esitatud suunistena. Täpsed annused, konsentratsioon ja kasutamisaegad sõltuvad kohalikest tingimustest, muude väetiste kasutamisest ja neid saab anda ainult objektiivse diagnoosi alusel.